

MAMULL®

BIOESTIMULANTE (WP)

MAMULL® Formulado en polvo mojable que favorece crecimiento vegetativo y estimula la brotación. Formulada en base a cepas nativas de microorganismos colonizadores de tejidos vegetales, y un acarreador orgánico. Posee características de estimulante biológico en los cultivos recomendados, con amplia aplicabilidad en frutales y hortalizas.

COMPOSICIÓN (% p/p)

<i>Bionectria ochroleuca</i> cepa Mitique*	0,33% p/p (3,3 g/kg)
<i>Trichoderma gamsii</i> cepa Volqui**	0,33% p/p (3,3 g/kg)
<i>Hypocrea virens</i> cepa Ñire***	0,33% p/p (3,3 g/kg)
Cofomulantes c.s.p.	100% p/p (1kg)

* Contiene una concentración de cepa 1×10^7 ufc/g

**Contiene una concentración de cepa 1×10^7 ufc/g

***Contiene una concentración de cepa 1×10^7 ufc/g

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Fabricado por Bio Insumos Nativa SpA

Parcela Antihue Lote 4 B2, Maule, Chile Fono: +56-71-2970696
Casilla 6 Maule/ventas@bionativa.cl | www.bionativa.cl

® Marca registrada de Bio Insumos Nativa SpA

Importado y distribuido por:

SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERÚ

Calle Coronel Andres Reyes N° 360 Of. 401 -A.
San Isidro- Lima 27 - Perú
Teléfono: (511) 444-3096



Lote:

Fecha Fabricación:

Fecha Vencimiento:

Cantidad:

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Para su seguridad en la preparación y durante la aplicación: evite el contacto con la piel, ojos y vestimenta, así como su ingestión. Utilizar ropa protectora adecuada para la labor.

Para su seguridad después de la aplicación: lávese después del trabajo y antes de comer. Cámbiese y lave la ropa de trabajo antes de volver a utilizarla.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INGESTIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

LOS ENVASES INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO ES TÓXICO A ORGANISMOS ACUÁTICOS, PECES, AVES, ANIMALES NI ABEJAS.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CITUC EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

FONO: +56-2-26353800

CITUC EMERGENCIAS QUÍMICAS

FONO: +56-2-22473600 - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

BIO INSUMOS NATIVA SPA.: (+56-71) 2970696/2970698

NO INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES GENERALES

MAMULL® estimulante biológico colonizante de tejidos vegetales con efecto cicatrizante sobre las heridas o cortes de poda.

CULTIVO	DOSIS (g/200L)	FORMA DE APLICACIÓN
Manzano Peral	200	Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la poda, cubriendo por completo. Aplicación a la hojarasca, para acelerar proceso de descomposición. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con llluvias.
Tomate		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la poda, cubriendo por completo. Aplicación a la hojarasca, para acelerar proceso de descomposición. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con llluvias.
Vid		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la poda, cubriendo por completo. Aplicación a la hojarasca, para acelerar proceso de descomposición. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con llluvias.
Cerezo Ciruelo Durazno Nectarino		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la poda, cubriendo por completo. Aplicación a la hojarasca, para acelerar proceso de descomposición. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con llluvias.
Arándano Frambueso		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la poda, cubriendo por completo. Aplicación a la hojarasca, para acelerar proceso de descomposición. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con llluvias.
Nogal Avellano Almendro		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la poda, cubriendo por completo. Aplicación a la hojarasca, para acelerar proceso de descomposición. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con llluvias.
Kiwi		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la poda, cubriendo por completo. Aplicación a la hojarasca, para acelerar proceso de descomposición. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con llluvias.
Cítricos		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la poda, cubriendo por completo. Aplicación a la hojarasca, para acelerar proceso de descomposición. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con llluvias.
Palto		Asperjar con MAMULL®, directamente sobre los cortes o heridas. Aplicar inmediatamente después de efectuada la poda, cubriendo por completo. Aplicación a la hojarasca, para acelerar proceso de descomposición. Mínimo una aplicación por corte o herida por temporada. No aplicar con llluvias.

Aplicación: Diluir MAMULL® en un recipiente con agua agitando fuertemente y luego dejar decantar por un minuto, antes de poner en equipo de aplicación o riego. La preparación debe aplicarse máximo 4 horas después de preparada y mantenida en agitación.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Incompatibilidad para aplicaciones conjuntas con compuestos cúpricos. No mezclar MAMULL® con plaguicidas y agroquímicos sin realizar antes una prueba de compatibilidad o por instrucción del fabricante. Consultar lista de compatibilidad con el fabricante. Es compatible con cianamida hidrogenada dosis mínima de 50 g/hl, con distintos tipos de adherentes y/o surfactantes foliares.

Almacenaje: MAMULL® debe ser almacenado en su envase original sellado, en ambiente fresco y seco. Tiempo máximo de almacenaje 12 meses.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados.

Período de Carencia: No tiene días de carencia, ni restricciones de reingreso.