

# Programa Arándano



Estado fenológico	Producto	Dosis	Volumen sugerido	Aplicación	Objetivo	Observaciones a la aplicación
		ml - gr/hL; L - Kg/ha	l/ha			
Caída de hojas	MAMULL®	100 gr/hL	300	Cubrimiento completo desde base de la planta	Fungicida, control enfermedades de madera. Colonización de heridas naturales y de poda.	-
Post poda y post heladas	MAMULL®	100 gr/hL	300 -500 l	Foliar	Fungicida, control enfermedades de madera. Colonización de heridas naturales y de poda.	Aplicación al follaje hasta 48 horas post poda.
Pre floración	NACILLUS® + MAMULL®	150 gr/hL	300 -500 l	Foliar	Control de PSS.	Aplicar a inicio de aparición de flores. Separar de la aplicación de cobre a lo menos 5 días.
		150 gr/hL			Fungicida, control enfermedades de madera. Colonización de heridas naturales y de poda.	
Floración	MAMULL®	100 gr/hL	200 - 400	Cubrimiento completo desde base de la planta	Fungicida, control enfermedades de madera. Colonización de heridas naturales y de poda.	Repetir contra condiciones de lluvia o presencia daño en hojas.
	SP-1®	2 L/ha	-	Riego	Solubilización de fosforo	Aplicar sincronizado con fertilización P.
Floración - Brotación	NACILLUS® + TRICHONATIVA®	150 gr/hL	300-500	Foliar	Control de Pseudomonas.	Aplicación conjunta, repetir en caso de lluvia.
		150 ml/hL			Control de <i>Botrytis</i> .	
Brotación	CENTEON MAX®	1 -2 lt/ha	-	Riego	Crecimiento raíces.	Aplicaciones vía riego.
Plena flor a cosecha	TRICHONATIVA®	150 ml/hL	400-600	Foliar	Control de <i>Botrytis</i> .	Repetir cada 10 días o intercalar según compatibilidad con fungicidas.
Flash de crecimiento de raíces (ambos)	TRICHONATIVA® + CENTEON MAX®	2 lts/ha	-	Riego	Control de Phytophthora y enfermedades de la madera.	Dosis por hL para drenching en plantas enfermas y vecinas, dosis por ha para aplicaciones preventivas por riego.
		1 – 2 Lt/ha	-		Crecimiento raíces.	
Pre cosecha (condiciones)	PUELCHÉ® WP	150 g/hl	400-600	Foliar	Control de <i>Botrytis</i> . Colonización de tejidos vegetales.	Aplicación contra condiciones o post lluvias.
Polillas	BETK-03®	50 g/hl	400-800 l	Foliar	Control de <i>Proeulia</i> .	Aplicar contra monitoreo, efecto residual 10 días.