

Estado fenológico	Producto	Dosis	Volumen sugerido	Aplicación	Objetivo	Observaciones a la aplicación
		ml - gr/hL; L - Kg/ha	l/ha			
Inicio caída de hojas	NACILLUS PRO® + MAMULL®	60 gr/hL	1.000 - 1.500	Foliar	Control de Venturia.	Aplicar con primeras hojas amarillas, repetir al 20, 50 y 80% de caída en caso de tener lesiones activas.
		100 gr/hL			Fungicida, control enfermedades de madera. Colonización de heridas naturales y de poda.	
Poda	MAMULL®	100 gr/hL	800 - 1.000	Foliar	Fungicida, control enfermedades de madera. Colonización de heridas naturales y de poda.	Aplicar con todas las boquillas abiertas.
Post poda y salida de invierno	MAMULL®	100 gr/hL	300 - 600	Foliar	Fungicida, control enfermedades de madera. Colonización de heridas naturales y de poda.	Aplicar con todas las boquillas abiertas.
	CORAZA®	Cubrir cortes, heridas y canchros.	-	Pintar	Control de hongos de madera. Cobertura y cicatrización de canchros, heridas y agallas.	Canchros húmedos, limpieza superficial. Canchros secos, sacar corteza y remover madera con cambio de textura.
Brotación	SP-1®	1,5 - 2 l/ha	-	Riego	Mejorar la captación de nutrientes de la planta.	Microorganismos solubilizadores de nutrientes.
Floración hasta caída de pétalos	NACILLUS PRO® + TRICHONATIVA®	60 gr/hL	1.000 - 1.500	Foliar	Prevención de Venturia.	Aplicación conjunta, repetir en caso de condiciones de alta humedad, complementando aplicaciones de Polisulfuro o fungicidas sistémicos.
		150 ml/hL			Control hongos de post cosecha (Botrytis - Alternaria).	
Flash de crecimiento de raíces (ambos)	TRICHONATIVA®+ CENTEON MAX®	1.5 -2 lts/ha	-	Riego	Control de enfermedades de suelo (Phytophthora).	Dosis por hL para drenching en plantas enfermas y vecinas, dosis por ha para aplicaciones preventivas por riego.
		1 - 2 kg-lt/ha	-		Crecimiento raíces.	
Pre cosecha (condiciones)	PUELICHE VTO® WP	150 gr/hl	1.000 - 1.500	Foliar	Eliminar exceso de humedad (Desecante). Colonización de tejidos.	Aplicación contra presencia agua libre. Y en precosecha
Polillas	BETK-03®	50 gr/hl	400 - 800 l	Foliar	Control de polillas (Proeulia).	Aplicar contra monitoreo, efecto residual 10 días, aplicar 90 Gd (base 10) después de captura en trampa.