

Estado fenológico	Producto	Dosis	Volumen sugerido	Aplicación	Objetivo	Observaciones
		ml-gr/hL; L-Kg/ha	l/ha			
Post cosecha (inicio de otoño)	TRICHONATIVA® + CENTEON MAX®	1 – 2 lt/ha	-	Riego	Control de enfermedades de suelo (Phytophthora).	Dosis por hL para drenching en plantas enfermas y vecinas, dosis por ha para aplicación preventiva por riego.
		1 – 2 lt/ha	-		Crecimiento raíces.	
Post cosecha a Receso invernal	MANEJO DE HUERTO	-	-	-	Revisar frecuencia y largo de riego según sectores con plantas enfermas.	Procurar iniciar el proceso de descomposición de la hojarasca.
Durante flash de crecimiento radicular y post flash (Primavera)	TRICHONATIVA® + CENTEON MAX®	1 – 2 lt/ha	-	Riego	Control de enfermedades de suelo (Phytophthora).	Dosis por hL para drenching en plantas enfermas y vecinas, dosis por ha para aplicación preventiva por riego.
		1 – 2 kg -lt/ha	-		Crecimiento raíces.	
Brotación	SP-1®	1,5 - 2 l/ha	-	Riego	Mejorar la captación de nutrientes de la planta.	Microorganismos solubilizadores de nutrientes.
Floración y cuaja	TRICHONATIVA® + CENTEON MAX®	150 ml/hL	1.500- 2.000	Foliar	Prevenir pudriciones (Botrytis).	Coloniza las flores previniendo la entrada de enfermedades.
		1 - 2 l/ha	-	Riego	Dar las mejores condiciones a la planta para retener fruta.	Bioestimular nutrición y desarrollo de la planta.
Post lluvias durante desarrollo de fruta	PUELICHE-VTO® (WP) + MAMULL®	150 g/hL	1.500 - 2.000	Foliar	Colonización del follaje.	Estimula las defensas de la planta y el desarrollo vegetativo.
		100 g/hL	300 - 600	Al suelo	Colonización y degradación de la hojarasca.	Aplicar con barra al suelo.